

®  
**(REUMOXICAM®)**

1 : meloxicam;

100 % 10 ;

(N- ), 188, , 0,1

01 06.

® - ( ) , ,

( ):

100 %.

15 , 1,6-1,8 / 1-6 .

(99 %).

11 ,

7-20 % . 11 % 32 %.

4 , 5'- (60 %

), *in vitro* , CYP 2C9 , CYP 3 4 (9 % ) .

16 % 4 %

5 %

7,5 15

7,5 ( «

»).

AUC

- ;
- ;
- / ( );
- ;
- ;
- ;
- ( );
- ;



15 /

45 79 / )

450 (

CYP 2C9 / CYP 3A4.

CYP 3A4)

CYP 2C9,

13±3

80 / )

(15 / )

45 / )

80 / ).

3

15

50 %,

(CYP)

( , );

» - - ). ( . «

-2.

/

( . « »),

»).

( - - ),

( 500 3 ) ( . «

»).

( . « »).

15 % ( ®),

( ) ( 3 ) 1 %





»).

®

®

®

®

®

®

1

(23 )

1,5

1 %

1,5 %.

(

);

:

;



®

15 1

15 /

2-3

( , ) ( « »).

( « »)

7,5 ( 1,5 ) ( « »).

( « »)

7,5 ( 1,5 ).

1,5 ).

( 25 / )

« 7,5 »).

« ».

( )

®, 15 / 1,5 , ( 18 )

4 3

) , ( ) ( . « »).

( . « »).

»).

1/10000, < 1/1000); (<1/10000); ( 1/10); ( 1/100, < 1/10); ( 1/1000, < 1/100); (

- ;

-

( . « / »).

:

-

;



— ), ( « / » « );  
— , ( « »);  
— , .  
— :  
— , .  
— , ;  
— , ;  
— , .  
— :  
— / , , , .  
« »).  
— , , , , .  
— , , , , ( « »).  
— .3 .  
— , .  
— 8 25 .  
1,5 . 3 5 . 1 . 5 .  
— .  
— « ».  
— ,04080, . , .74.