

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

**БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ**

**Склад:**

*діюча речовина:* брильянтовий зелений;  
100 мл розчину містять брильянтового зеленого 1 г;  
*допоміжна речовина:* етанол 60 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина інтенсивно зеленого кольору із запахом спирту.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування. Чинить антимікробну дію. Препарат активний відносно грампозитивних бактерій.

*Фармакокінетика.*

Препарат місцевої дії. Даних про всмоктування у кров та участь у метаболічних процесах організму не виявлено.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкї форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Особливі заходи безпеки.**

Не допускати потрапляння препарату в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, які містять органічні сполуки, може денатурувати білки, утворювати нові сполуки.

Не сумісний із дезінфікуючими препаратами, які містять активний йод, хлор, луги (в тому числі розчин аміаку).

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

**Особливості застосування.**

Не слід допускати потрапляння розчину на слизові оболонки, оскільки етанол, що міститься у препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Активність препарату суттєво зменшується у присутності сироватки крові.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Застосовувати.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Наносити на поверхню шкіри, при порушенні її цілісності охоплюють навколишні здорові тканини. При захворюваннях очей змазувати краї повік.

#### ***Діти.***

Застосовувати.

#### ***Передозування.***

Не спостерігалось.

#### ***Побічні реакції***

Алергічні реакції (свербіж, кропив'янка). При попаданні розчину на слизову оболонку ока виникає печіння, слезотеча, можуть з'явитися опіки.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.*

**Термін придатності.** 2 роки.

#### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

#### **Упаковка.**

По 10 мл, 20 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

#### **Виробник.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

#### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

## **БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ**

#### ***Склад:***

*діюча речовина:* брильянтовий зелений;

100 мл розчину містять брильянтового зеленого 1 г;

*допоміжна речовина:* етанол 60 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

**Основні фізико-хімічні властивості:** рідина інтенсивно зеленого кольору із запахом спирту.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

#### ***Фармакологічні властивості.***

***Фармакодинаміка.***

Антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування. Чинить антимікробну дію. Препарат активний відносно грампозитивних бактерій.

***Фармакокінетика.***

Препарат місцевої дії. Даних про всмоктування у кров та участь у метаболічних процесах організму не виявлено.

#### **Клінічні характеристики.**

##### ***Показання.***

Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

### ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

### ***Особливі заходи безпеки.***

Не допускати потрапляння препарату в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, які містять органічні сполуки, може денатурувати білки, утворювати нові сполуки.

Не сумісний із дезінфікуючими препаратами, які містять активний йод, хлор, луги (в тому числі розчин аміаку).

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

### ***Особливості застосування.***

Не слід допускати потрапляння розчину на слизові оболонки, оскільки етанол, що міститься у препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Активність препарату суттєво зменшується у присутності сироватки крові.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Застосовувати.

### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Наносити на поверхню шкіри, при порушенні її цілісності охоплюють навколишні здорові тканини. При захворюваннях очей змазувати краї повік.

### ***Діти.***

Застосовувати.

### ***Передозування.***

Не спостерігалось.

### ***Побічні реакції.***

Алергічні реакції (свербіж, кропив'янка). При попаданні розчину на слизову оболонку ока виникає печіння, слезотеча, можуть з'явитися опіки.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.*

**Термін придатності.** 2 роки.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

### ***Упаковка.***

По 10 мл або 20 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

### ***Виробник.***

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.