

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
РИЦИНОВА ОЛІЯ
(OLEUM RICINI)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: рицинова олія;
100 мл препарату містять рицинової олії 100 мл.

Лікарська форма. Олія.

Рідина прозора, густа і в'язка, безбарвна або злегка жовтувата зі слабким запахом і своєрідним неприємним смаком. На повітрі в тонкому шарі повільно густішає, але не утворює щільної або твердої плівки.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Лубнифарм».
Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петрівського, 16.

Фармакотерапевтична група.

Проносний засіб. Код АТСА06А В05.

Фармакологічні властивості. При застосуванні внутрішньо гідролізується ліпазою у тонкому кишечнику з утворенням рицинолевої кислоти, яка спричиняє подразнення рецепторів кишечника та рефлекторно посилює його перистальтику. Проносний ефект настає звичайно через 5 - 6 годин. Препарат також спричиняє рефлекторне скорочення міометрія.

Показання для застосування.

Внутрішньо – запори, зовнішньо – для лікування опіків, ран, виразок, для пом'якшення шкіри, видалення лупи, зміцнення волосся.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість. Отруєння жиророзчинними речовинами (фосфором, бензолом тощо) та екстрактом папороті чоловічої. Гострий живіт.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Відсутні.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому здоров'ю.

Особливі застереження.

Відсутні.

Спосіб застосування та дози.

Як проносний засіб призначають внутрішньо дорослим по 15 - 30 мл, дітям – по 5 - 10 - 15 мл на прийом (1 чайна, десертна або столова ложка).

Зовнішньо застосовують при опіках, виразках, тріщинах, для пом'якшення шкіри, видалення лупи, зміцнення волосся.

Передозування.

Діарея. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Атонія кишечника при тривалому застосуванні.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл або 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.