

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КАРДІО-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Spigelia 200CH 20 мг, Cactus 200CH 20 мг, Kalium carbonicum 200CH 20 мг, Lachesis 1000CH 20 мг, Ignatia 1000CH 20 мг;

допоміжна речовина: цукор кондитерський.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Зменшує серцебиття, болі в ділянці серця, сприяє стабілізації артеріального тиску.

Показання для застосування.

У складі комплексної терапії: нейроциркуляторна дистонія, неврози з підвищеною дратівливістю; артеріальна гіпертензія I ступеня.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Пацієнтам із рідкісною вродженою непереносимістю фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози або дефіцитом сахарози-ізомальтази не слід застосовувати препарат.

Препарат містить крупку цукрову, що слід враховувати пацієнтам з цукровим діабетом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності та годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності і годування груддю не досліджувалось.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не призначають дітям віком до 1 року.

Дітям віком від 1 до 3 років застосування препарату можливе тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям від 7 років – по 5 гранул під язик до повного розсмоктування. Приймати при нападах болю в ділянці серця, посиленому серцебитті 3–5 разів через кожні 10–15 хвилин до покращання стану. Якщо біль не минає, хворому слід звернутися до лікаря.

При постійному болю в ділянці серця приймати 3-5 разів на добу (у комплексі з іншими протиангінальними препаратами).

Для профілактики приймати 1-2 рази на добу. Курс лікування – 2-3 місяці. За необхідності курс повторити через 2-3 тижні.

Дітям віком від 1 до 7 років при нейроциркуляторній дистонії, що супроводжується посиленням серцебиття – по 3 гранули, розчинені у невеликій кількості води 2–3 рази на день. Тривалість лікування лікар визначає індивідуально.

Препарат слід приймати за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди.

Передозування.

У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі реакції гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можливе сумісне застосування з будь-якими методами лікування і лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами). Інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.