

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

A-ДИСТОН
(A-DISTON)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл крапель містить настойку з лікарської рослинної сировини (1:10) глоду плодів (*Crataegi fructus*), собачої кропиви трави (*Leonuri cardiacaehherba*), валеріани коренів (*Valerianaegradix*), плодів фенхелю (*Fructus foeniculi vulgaris*), м'яти листя (*Menthae piperitae folium*), арніки квіток (*Arnicaeflos*) (екстрагент - етанол 70 %);
1 мл препарату містить 0,64 мл етанолу.

Лікарська форма. Краплі для перорального застосування.

Прозора рідина світло-коричневого кольору з приємним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Біолік»,
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118.

Назва і місцезнаходження заявника.

ТОВ «Українська фармацевтична компанія»,
02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29.

Фармакотерапевтична група. Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ С01ЕХ.

Комбінований препарат рослинного походження, що містить комплекс біологічно активних речовин: із глоду плодів, що мають гіпотензивні, кардіопротекторні, спазмолітичні властивості; із собачої кропиви трави, що мають гіпотензивний, седативний, спазмолітичний ефекти; із плодів фенхелю – спазмолітичну дію; із арніки квіток – тонізуючу, кардіопротекторну активність; із м'яти листя – спазмолітичний, седативний вплив. Препарат посилює кровообіг у судинах головного мозку і коронарних судинах серця, знижує збудливість міокарда, має антигіпотоксичні, антиаритмічні, заспокійливі властивості.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні функціональних розладів діяльності серцево-судинної системи, що супроводжуються аритмією, ішемією та гіпоксією (нейроциркуляторна дистонія, вегетоневроз) з метою кардіопротекції. Як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму.

Противоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, відома алергія до рослин родини складноцвітих, алкоголізм в анамнезі, одночасне застосування препаратів, що містять алкоголь; виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки; цироз печінки; виражена артеріальна гіпотензія або брадикардія; хворі на депресію та інші захворювання, що супроводжується пригніченням діяльності центральної нервової системи; бронхіальна астма.

Належні заходи безпеки.

Під час лікування препаратом слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв. У період лікування препаратом необхідний контроль артеріального тиску. При застосуванні протягом тривалого часу і у великій кількості препарат погіршує травлення, спричиняє головний біль, збуджує нервову систему, а у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями може погіршити діяльність серця. Хворим з гастроєзофагеальним рефлюксом не слід вживати препарати, що містять у складі м'яти листя, оскільки може посилитися печія. Хворим із жовчнокам'яною хворобою та іншими захворюваннями жовчовивідних шляхів застосовувати препарат слід з обережністю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

У період застосування препарату забороняється керувати автомобілем або працювати з потенційно небезпечними механізмами.

Діти. Досвіду застосування препарату дітям немає.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим внутрішньо по 20-30 крапель 3 рази на добу до їди. Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально і в середньому становить 30 днів.

Передозування.

При значному підвищенні дози можливі диспептичні розлади, прояви гіперчутливості, рідко – сонливість, зниження артеріального тиску, брадикардія, відчуття пригніченості, підвищеної втомлюваності, запаморочення, головний біль, нудота, а у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями можлива біль у ділянці серця, що вимагають припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри); розлади з боку шлунково-кишкового тракту, у т.ч. диспептичні розлади, сухість у роті, нудота, блювання, запор або діарея, біль у животі; рідко – порушення сну, сонливість; зменшення частоти серцевих скорочень; запаморочення; головний біль, відчуття втоми, слабкості, пригніченого стану, зниження розумової та фізичної працездатності; поліурія; пітливість, озноб.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Оскільки препарат А-Дістон містить спирт етиловий 70 %, можливе потенціювання дії снодійних препаратів, транквілізаторів, нейролептиків; препарати собачої кропиви, валеріани, глоду можуть потенціювати фармакологічні ефекти седативних, снодійних, анагетичних, антигіпертензивних препаратів та серцевих глікозидів, а також посилюють дію алкоголю.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.

Упаковка.

По 30 мл або 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.