

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ГРУДНИЙ ЕЛІКСИР**  
**(ELIXIR PECTORALIS)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 мл рідини містить солодкового кореня екстракту густого (2,75 : 1) 207 мг; олії анісової 3,4 мг; аміаку розчину концентрованого 13,8 мг;

*допоміжні речовини:* етанол 90 %, вода очищена.

**Лікарська форма.** Рідина.

Рідина бурого кольору із запахом аміаку і анісової олії.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"  
або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

**Фармакотерапевтична група.** Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A10.

Комбінований препарат з відхаркувальною та протизапальною дією. Речовини, що входять до складу препарату, стимулюють секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, розріджують мокротиння та сприяють його відкашлюванню. Грудний еліксир пом'якшує сухий непродуктивний кашель.

**Показання для застосування.** Гострі та хронічні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються утрудненим відходженням мокротиння.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 12 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** При зберіганні препарату можливе утворення осаду, що не призводить до зниження його ефективності. Перед вживанням препарату флакон необхідно збовтувати.

**Особливі застереження.**

*- Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Оскільки до складу препарату входить спирт етиловий та екстракт солодкового кореня густого (останній підвищує рівень естрогенів, внаслідок чого порушується гормональний баланс) препарат протипоказаний жінкам у періоди вагітності та годування груддю.

*- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

У період лікування слід утриматись від керування транспортними засобами та роботи, що потребує підвищеної уваги та швидкої реакції.

*- Діти.*

Оскільки до складу препарату входить спирт етиловий, його не застосовують дітям віком до 12 років.

**Спосіб застосування та дози.** Дорослим призначають внутрішньо по 20-40 крапель на прийом 3-4 рази на добу. Препарат приймають за 30 хв до або через 1 годину після їди попередньо розчинивши його в невеликій кількості рідини. Тривалість курсу лікування встановлює лікар індивідуально.

**Передозування.** Випадки передозування до теперішнього часу не були зареєстровані.

**Побічні ефекти.**

*Порушення з боку імунної системи:* алергічні реакції (гіперемія, висипи, свербіж, набряки, бронхоспазм).

*Шлунково-кишкові розлади:* нудота, блювання.

*Неврологічні розлади:* інколи можливе нетривале збудження, а потім пригнічення центральної нервової системи.

*Порушення обміну речовин, метаболізму:* в окремих випадках можливе порушення водно-електролітичного балансу (набряки).

*Кардіальні порушення:* підвищення артеріального тиску.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не бажано приймати одночасно з антибіотиками, похідними нітрофуранового ряду.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати при температурі від 15 °С до 25 °С.

*Можливе випадання осаду!*

*Зберігати у недоступному для дітей місці!*

**Упаковка.** По 25 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.