

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**АМІЗОН® МАКС**  
(AMIZON® MAX)

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* амізон® (енісаміум йодид);  
1 капсула містить амізону® (енісаміуму йодиду) 0,5 г;  
*допоміжна речовина:* магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Капсули.

Тверді желатинові капсули циліндричної форми № 1 або № 0. Корпус і кришечка жовтого кольору. Вміст капсули – кристалічний порошок жовтого або жовто-зеленого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Фармак».  
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

**Фармакотерапевтична група.** Протівірусні засоби для системного застосування.

Код АТС J05A X.

Амізон® – похідне ізонікотинової кислоти. Виявляє інгібуючий вплив на віруси грипу, має інтерферогенні властивості, підвищує резистентність організму до вірусних інфекцій, чинить протизапальну, жарознижувальну і анальгетичну дії.

Протівірусна дія Амізону® пов'язана із безпосереднім його впливом на гемаглютиніни вірусу грипу, внаслідок чого віріон втрачає здатність приєднатися до клітин-мішеней для подальшої реплікації.

Протизапальна дія є результатом стабілізації клітинних і лізосомальних мембран, уповільнення дегрануляції базофілів, антиоксидантної дії, нормалізації рівня простагландинів, циклічних нуклеотидів та енергетичного обміну у вогнищі запалення. Жарознижувальні властивості даного засобу зумовлені впливом на терморегулюючі центри мозку.

Анальгезуюча дія препарату здійснюється через ретикулярну формуцію стовбура мозку.

Амізон® посилює персистуючий імунітет шляхом підвищення рівня ендogenous інтерферону в плазмі крові в 3-4 рази, лізоциму та збільшення титру антитіл до збудників інфекцій, а також клітинного імунітету – за рахунок стимуляції функціональної активності Т-лімфоцитів і макрофагів. Даний засіб є потужним індуктором ендogenous інтерферону.

Після перорального застосування Амізон® швидко потрапляє у кров, максимальна концентрація його в крові спостерігається через 2-2,5 години після прийому. Амізон® та його метаболіти довго циркулюють у кровоносному руслі (період напіввиведення становить 13,5-14 годин), метаболізується в печінці, але швидко виводиться з тканин (період напіввиведення становить 2-3 годин). Виводиться з організму на 90-95 % із сечею у вигляді метаболітів.

**Показання для застосування.**

Лікування грипу та ГРВІ.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препаратів йоду та до інших компонентів препарату. Наявність алергічних реакцій незалежно від природи алергену в анамнезі. Тяжкі органічні ураження печінки та нирок.

**Особливі застереження.**

Слід обережно призначати препарат пацієнтам із захворюваннями щитовидної залози особливо при гіпертиреозі.

**Застосування у період вагітності або годування груддю .** Препарат протипоказаний для застосування у першому триместрі вагітності. Застосування у другому та третьому триместрі можливе лише за призначенням лікаря. Даних щодо застосування препарату жінкам у період годування груддю немає.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Прийом препарату Амізон® Макс не впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами.

**Діти.** Препарат у даній лікарській формі дітям не застосовують.

**Спосіб застосування та дози.**

Амізон® Макс застосовують внутрішньо після їди, не розжовуючи.  
Дорослим призначають по 1 капсулі 2-4 рази на добу протягом 5-7 днів.  
Максимальна разова доза – 1 г, добова – 2 г.

**Передозування.**

Про випадки передозування Амізоном® Макс не повідомлялось. При передозуванні можливе посилення проявів побічних реакцій: забарвлення слизових оболонок у коричневий колір, рефлекторне блювання, болі у животі та діарея. Можливий розвиток набряків, еритеми, вугреподібних та бульозних висипань, пропасниці.

*Лікування:* промивання шлунка, симптоматичне лікування.

**Побічні ефекти.**

*Алергічні реакції:* реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, кропив'янку, ангіоневротичний набряк, свербіж.

*З боку системи травлення:* сухість та гіркота у роті, набряк слизової оболонки порожнини рота, гіперсаливація, забарвлення язика у жовтий колір, нудота, блювання, печія, біль у животі, тяжкість у правому підребер'ї, пронос, здуття живота.

*З боку системи дихання:* задишка, відчуття печіння в горлі.

*Інші:* головний біль, запаморочення, слабкість, коливання артеріального тиску.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Амізон® Макс посилює дію антибактеріальних та імуномодулюючих засобів. Доцільною є комбінація даного препарату з аскорбіновою кислотою та іншими вітамінами. Також Амізон® Макс можна призначати одночасно із застосуванням рекомбінантного інтерферону.

**Термін придатності .** 2 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 10 капсул у блістері. По 1 блістеру в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.