

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ІНФЛЮЦИД**  
**(INFLUCID®)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить Aconitum D3 25 мг, Gelsemium D3 25 мг, Ipecacuanha D3 25 мг, Phosphorus D5 25 мг, Bryonia D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 25 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.

**Лікарська форма.** Таблетки.

Білі або майже білі, іноді з окремими темними крапками, двоплощинні таблетки зі скошеною кромкою.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.  
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.  
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат містить шість активних компонентів, найбільш прийнятних для лікування гострих застудних захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу. Засіб швидко купірує типові ознаки гострої інфекції дихальних шляхів, такі як гарячка, головний біль, болючість м'язів, а також риніт, фарингіт. Препарат посилює природний захист організму і сприяє швидкому видужанню і відновленню сил після перенесеного захворювання, у такий спосіб зменшує ознаки виснаження (астенічний синдром) або запобігає їм. Застосування препарату при перших проявах захворювання або відразу після контакту з людьми, які захворіли, сприяє запобіганню розвитку захворювання.

**Показання для застосування.**

Профілактика і лікування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

При збереженні високої температури тіла або при її підвищенні понад 39 °С, при збереженні або нез'ясованості симптоматики, а також при появі нових симптомів слід проконсультуватися з лікарем, оскільки може йти мова про хвороби, які вимагають медичної допомоги.

Застереження для хворих з глютенною хворобою. Інфлюцид містить пшеничний крохмаль.

Препарат містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати препарат.

### **Особливі застереження.**

#### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Інфлюцид у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*** Не впливає.

***Діти.*** Препарат призначають дітям віком від 1 року.

#### **Спосіб застосування та дози.**

*При гострому захворюванні* дітям віком від 1 до 12 років застосовувати по 1 таблетці кожні 2 години (не більше 8 таблеток на добу) до настання покращення. При подальшому лікуванні приймати по одній таблетці 3 рази на день. Дітям віком від 12 років і дорослим *при гострому захворюванні* приймати по 1 таблетці щогодини (не більше 12 таблеток на добу) до настання покращення, далі – по 1-2 таблетки 3 рази на день. Тривалість лікування – 7-10 днів (до повного зникнення симптомів).

*Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції* дітям віком від 1 до 12 років рекомендується застосовувати по 1 таблетці 3 рази на день; дітям віком від 12 років і дорослим приймати по 1-2 таблетки 3 рази на день. Тривалість застосування після контакту з хворими на респіраторну інфекцію або грип – 1 тиждень.

Таблетки приймають за півгодини до їди або через півгодини після їди, даючи їм повільно розчинитися в роті. Дітям віком до 3 років рекомендується для зручності застосування розчиняти таблетку у невеликій кількості води (наприклад у чайній ложці води).

#### **Передозування.**

У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

#### **Побічні ефекти.**

У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі, шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання або діарею. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.