

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

Цисто-аурин
(Cysto-aurin)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: сухий екстракт трави золотарника звичайного;

1 таблетка містить сухого екстракту трави золотарника звичайного (*Extractum Herbae Solidaginis virgaureae siccum*) (5-7:1) (екстрагент – станол 60 %) 300 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат, кросповідон, кремнію діоксид, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний.

Лікарська форма. Таблетки.

Двоопуклі продовгуваті таблетки від сіро-зеленого до зеленувато-коричневого кольору з можливою мармуровістю поверхні, з ризкою для поділу з одного боку.

Назва і місцезнаходження виробника.

Фарма Вернігероде ГмбХ/

Pharma Wernigerode GmbH.

Дорнбергсвг 35, D-38855 Вернігероде, Німеччина /

Dornbergsweg 35, D-38855 Wernigerode, Germany.

Заявник.

Еспарма ГмбХ/Esparma GmbH.

Сіпарк 7, 39116 Магдебург, Німеччина/

Seepark 7, 39116 Magdeburg, Germany.

Фармакотерапевтична група.

Інші засоби, що використовуються в урології. Різні засоби, включаючи комбінації.

Код АТС G04BX50

Трава золотарника звичайного містить тритерпенсапонін, флавоноїди, лейокарпозид, віргауреозид та інші активні компоненти. Екстракту золотарника звичайного притаманна комплексна дія: він має протизапальні властивості, характеризується діуретичною (акваретичною) дією та спазмолітичним впливом на гладку мускулатуру сечовивідних шляхів. Водночас екстракт золотарника виявляє антибактеріальну активність, у тому числі щодо *Staphylococcus aureus*, *St. epidermidis*, *St. Faecalis*, *Bacillus subtilis* та інші. Активні речовини екстракту гальмують ріст ряду грибів: *C. albicans*, *C. Krusei*, *C. Tropicalis* та інші.

Запобігає каменеутворенню шляхом розбавлення сечі та зниження концентрації у ній літогенних субстанцій. Оскільки запалення та звуження сечовивідних шляхів пов'язане з наявністю сечових каменів, важливого значення для вторинної профілактики набуває також діуретична та протизапальна дія золотарника.

Отже, Цисто-аурин є першочерговим засобом при запальних та інфекційних захворюваннях сечовивідних шляхів і для їх профілактики.

Показання для застосування.

Санація сечовивідних шляхів при інфекційних та запальних процесах у складі комплексної терапії (цистит, пілонефрит та інші.), при сечокам'яній хворобі та за наявності піску у нирках; профілактика утворення каменів та піску у нирках.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до золотарника звичайного або до інших складових лікарського засобу.

Не рекомендується застосовувати при набряках обумовлених серцевою або нирковою недостатністю.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

За наявності крові у сечі, якщо піднялася температура або якщо не відбувається полегшення протягом 5 днів, необхідно звернутися до лікаря.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Не слід застосовувати препарат у період вагітності та годування груддю, оскільки таке застосування досліджено недостатньо.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти. Через недостатню кількість даних досліджень не рекомендується застосовувати препарат дітям до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком від 12 років по 1 таблетці 4-5 разів на добу.

Таблетки приймають, не розжовуючи, запивають достатньою кількістю рідини (наприклад, склянкою води)

Курс лікування: від 5 днів до 8 тижнів. За необхідності можливе проведення повторних курсів лікування, що визначає лікар індивідуально.

Передозування.

На цей час невідомо про інтоксикації при прийомі Цисто-аурину або інших препаратів з трави золотарника звичайного. Можливе посилення симптомів, зазначених у пункті "Побічні ефекти". При прийомі надмірної кількості препарату слід звернутися до лікаря.

Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Рідко спостерігались алергічні реакції (свербіж, висипання) та порушення з боку травного тракту (нудота, блювання, діарея).

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутись до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідомо.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 таблеток у блістері, по 2 або по 6 блістерів в упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.