

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**АРТРОФОН**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 таблетка містить антитіла до людського фактора некрозу пухлини альфа афінно очищені; суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C200 – 3 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

Таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці з рискою нанесено напис MATERIA MEDICA, на іншому плоскому боці нанесено напис ARTHROFON.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ "НВФ "МАТЕРІА МЕДИКА ХОЛДІНГ".

Російська Федерація, 127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9.

**Фармакотерапевтична група.** Гомеопатичний лікарський засіб.

Препарат виявляє протизапальну та анальгезуючу дію; інгібує продукування медіаторів запалення, покращує трофіку тканин. Препарат перешкоджає прогресуванню запальних уражень тканин та органів-мішеней при запально-дегенеративних захворюваннях суглобів.

**Показання для застосування.**

Комплексне лікування гострих та хронічних, запальних та дегенеративних захворювань суглобів (остеоартроз, у т.ч. спондилоартроз; остеохондроз; ревматоїдний артрит).

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

На 3-5 добу після початку лікування можливе помірно виражене минуле посилення больового синдрому або місцевих ознак запалення, що не вимагає змін у режимі фармакотерапії. В окремих випадках при вираженому посиленні больового синдрому або місцевих ознак запалення слід тимчасово зменшити дозу до 1-2 таблеток на добу.

До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не слід призначати пацієнтам із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Дані щодо ефективності та безпеки застосування відсутні, тому не слід призначати препарат у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими потенційно небезпечними механізмами.

*Діти.* Не застосовувати дітям.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовувати внутрішньо, не пов'язуючи з прийомом їжі. Таблетку слід тримати в роті до повного розчинення, не ковтаючи її.

Приймають по 1 таблетці 3 – 4 рази на добу. При досягненні стійкого ефекту – 2-3 рази на добу.

Курс лікування – 6 місяців.

При вираженому больовому синдромі та загостренні хронічних запальних процесів у суглобах приймають по 2 таблетки 4 рази на добу (добова доза – 8 таблеток). При покращанні стану слід поступово знизити дозу до 1 таблетки 3 – 4 рази на добу.

За необхідності, препарат можна приймати з іншими лікарськими засобами у складі комплексної терапії.

**Передозування.**

Випадків передозування дотепер не зареєстровано. При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано. Можливе поєднання препарату з нестероїдними протизапальними засобами.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 таблеток у блістері. 2 блістери у картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.