

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

**БРОНХАЛІС-ХЕЕЛЬ**  
**(BRONCHALIS-HEEL®)**

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить: Atropa bella-donna D4 – 30 мг, Bryonia D4 – 60 мг, Cephaelis ipecacuanha D4 – 30 мг, Hyoscyamus niger D4 – 60 мг, Kaliumstibyltartaricum D4 – 30 мг, Kreosotum D5 – 30 мг, Lobaria pulmonaria D4 – 30 мг, Lobelia inflata D4 – 30 мг;  
*допоміжні речовини:* магнію стеарат, лактозамоніогідрат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі плоскі таблетки з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, із запахом креозоту, в окремих випадках, після зберігання, без запаху.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.** Препарат чинить протизапальну, відхаркувальну, бронхолітичну, проти кашльову та імуномодуючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, які входять до складу препарату.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Гострі, хронічні запальні та обструктивні захворювання дихальних шляхів, бронхіт, трахеїт, кашель курця, бронхіальна астма, плеврит.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

**Особливі заходи безпеки.** Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не можна застосовувати препарат. При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Випадки негативного впливу невідомі.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Разова доза: дорослим та дітям віком від 6 років – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування), дітям віком від 3 до 6 років – 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно перемішуючи, розчинити у 20 мл (4 чайні ложки) кип'яченої води кімнатної температури та приймати разову дозу: 2 чайні ложки (залишки розчину зберігати в захищеному від світла місці при кімнатній температурі не більше однієї доби).

Приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди.

У разі гострого початку захворювання приймати разову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин.

Курс лікування – 2-4 тижні.

Лікар може зменшувати частоту прийому до 1-2 разів на добу та за необхідністю повторювати курс лікування через 2-3 тижні.

**Діти.** Препарат застосовувати для лікування дітям віком від 3 років.

**Передозування.** Не відзначалося.

**Побічні реакції.** У поодиноких випадках можуть виникати алергічні реакції внаслідок індивідуальної чутливості до компонентів препарату.

**Термін придатності.** 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

**Несумісність.** Невідома.

**Упаковка.** Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ/  
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/  
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.