

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**КЛІМАКСАН ГОМЕОПАТИЧНИЙ**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить Cimicifuga C200 – 0,8 мг, Lachesis C50 – 0,8 мг, Apis C200 – 0,8 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

Таблетки плоскоциліндричної форми з фаскою, білого або майже білого кольору .

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «НВФ «МАТЕРІА МЕДИКА ХОЛДІНГ».

Російська Федерація, 127473, м . Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9.

**Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат усуває вегето-судинні розлади, зумовлені гормональним дисбалансом, який характерний для передклімактеричного та клімактеричного періодів. Справляє помірну седативну дію.

**Показання для застосування.**

Застосовується як симптоматичний засіб у терапії проявів клімактеричного синдрому (дратівливість, емоційна лабільність, порушення сну, головний біль, запаморочення, серцебиття, підвищена пітливість, припливи).

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Особливі застереження.**

Препарат містить лактозу, тому його не слід призначати пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Дані щодо ефективності та безпеки застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутні, тому його не призначають у ці періоди.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Дані про вплив на швидкість реакції відсутні, тому слід приймати препарат з обережністю.

**Діти.**

Препарат не застосовують дітям.

**Спосіб застосування та дози .**

Препарат приймають внутрішньо. Разова доза – 1 таблетка. Таблетку тримають у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

Препарат приймають кожного дня, 2 рази на добу, вранці і ввечері.

При тяжкому перебігу клімаксу можливе збільшення кількості прийомів препарату до 3-4 разів на добу.

Рекомендована тривалість лікування препаратом – 1-2 місяці.

За необхідності курс лікування можна повторити через 2-3 тижні.

**Передозування.**

При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

При застосуванні препарату за вказаними показаннями до застосування та у рекомендованих дозах побічної дії не виявлено.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано.

За необхідності препарат можна застосовувати сумісно з іншими засобами.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.