

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ХОЛОСАС**

**Склад:**

*діюча речовина:* екстракт шипшини рідкий;

1 г сиропу (що відповідає 0,7 мл) містить екстракт шипшини рідкий (Fructis Rosae) (1:0,7) (екстрагент: вода очищена) з кислотністю не менше 3,5 % у перерахуванні на кислоту яблучну - 0,4 г.

*допоміжна речовина:* цукор.

**Лікарська форма.** Сироп.

*Основні фізико-хімічні властивості:*

Густа сиропоподібна рідина темнокоричневого кольору зі специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються при біліарній патології. Код АТХ А05А Х.

**Фармакологічні властивості.**

Дія препарату Холосас пов'язана з впливом комплексу компонентів, що входять до складу плодів шипшини, в тому числі таких, як вітаміни В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, С, Е, К, РР, провітамін А, цукор 14-16%, яблучна і лимонна кислоти, флавоноїди, пектини - 25%, ефірні масла, декстрин, ванілін, лецитин, солі К, Са, Fe, Mg.

Холосас підвищує функціональну здатність печінки, збільшує секрецію жовчі, збільшує вміст в жовчі холатів, зменшує в'язкість жовчі. Жовчогінна дія препарату зумовлена вмістом флавоноїдів. Екстракт шипшини в складі Холосас має також вплив і на інші функції організму - нормалізує і стимулює секрецію залоз шлунка, підвищує ферментативну активність шлункового соку, посилює перистальтику кишечника при його атонії. Також сприяє протизапальній дії за рахунок вмісту аскорбінової кислоти (вітаміну С).

Завдяки наявності в плодах шипшини органічних кислот і пектинів Холосас виявляє діуретичну дію.

Органічні кислоти у складі Холосас (яблучна, лимонна) збуджують діяльність слинних залоз, впливають на виділення жовчі і панкреатичного соку, покращують апетит і травлення, сприяє зниженню гнильних процесів в організмі.

Аскорбінова кислота екстракту шипшини у складі Холосас виявляє антисклеротичну і протизапальну дію, активізує ферментні системи і окисно-відновні процеси в організмі, позитивно впливає на вуглеводний обмін і посилює регенерацію тканин, підвищує опірність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Як допоміжний засіб при хронічних некалькульозних холециститах, холангітах, хронічних гепатитах; при С- та Р-гіповітамінозах; медикаментозних та алкогольних інтоксикаціях.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Обтурація жовчовивідних шляхів, калькульозний холецистит, тромбоз флєбіт і схильність до нього, недостатність кровообігу, ендокардит, декомпенсований цукровий діабет, тяжкі захворювання нирок.

**Особливі заходи безпеки.**

З обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет (препарат містить цукор) а також пацієнтам, схильним до тромбоутворення та до розвитку алергічних реакцій.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не вимагає виключення зі схеми комплексного лікування інших лікарських засобів.

При спазмах жовчовивідних шляхів показані спазмолітичні та атропіноподібні препарати. При гострих запальних процесах жовчовивідних шляхах та жовчному міхурі призначати спільно з антимікробними засобами.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

**Особливості застосування.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

З обережністю препарат призначати у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Особливих застережень немає.

**Спосіб застосування та дози.**

Холосас приймати внутрішньо за 30 хв до їди. Дорослим та дітям віком від 14 років – по 5 мл (1 чайна ложка) 2-3 рази на добу. Дітям віком від 3 до 6 років – по 1,25 мл ( чайної ложки) 2-3 рази на добу; віком від 6 до 14 років – по 2,5 мл ( чайної ложки) 2-3 рази на добу.

Дітям препарат застосовувати за призначенням лікаря.

Тривалість застосування визначається лікарем індивідуально та залежить від характеру і вираженості захворювання та супутньої терапії.

**Діти.**

Дітям віком до 3 років препарат не застосовувати. Дітям віком від 3 років рекомендується застосовувати лікарський засіб за призначенням лікаря.

**Передозування.**

Довготривале застосування препарату може спровокувати розвиток неінфекційної жовтяниці.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції, у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, печія. У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутись до лікаря.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 130 г у банках у пачках; по 130 г або 250 г, або по 300 г у флаконах, у пачках.

По 130 г у банках без пачки; по 130 г або 250 г, або 300 г у флаконі без пачки.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

ПАТ «Вітаміні».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31.