

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА

Спосіб лікарського засобу:

Склад речовина: 1 флакон містить настойки кореневищ з коренями ехінацеї пурпурової (*Echinacea purpureae radix*) (1:10) (екстрагент – етанол 50 %) 50 мл.

Фармацевтична форма. Настойка.

Зовнішня рідина червонувато-коричневого кольору. У процесі зберігання допускається утворення осаду.

Місцева назва і місцезнаходження виробника.

АТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Вулиця Кірова, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Імуномодулятори. Код АТС L03A X.

Комплекс діючих речовин підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів і макрофагів, стимулює синтез інтерлейкіну-1, стимулює трансформацію В-лімфоцитів у плазматичні клітини, покращує функції Т-хелперів. Інулін, лавулоза та бетаїн покращують процеси обміну, особливо у печінці та нирках. Має противірусні, антибактеріальні, протимікотичні властивості.

Показання для застосування.

Комплексне лікування імунодефіцитних станів при хронічних рецидивуючих запальних захворюваннях різної локалізації стан після антибіотикотерапії, цитостатичної, імунодепресивної, променевої терапії. Початкові прояви ГРВІ, при тривалому застосуванні антибіотиків. Місцеве лікування ран, що тривалий час не загоюються.

Противпоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату або до рослин родини складноцвітних; захворювання сполучної тканини (колагенози), системний склероз та інші аутоімунні захворювання.

Грибкові захворювання (туберкульоз, цукровий діабет), захворювання лейкоцитарної системи крові (лейкоз, агранулоцитоз), онкологічні захворювання, ревматизм, СНІД, ВІЛ-інфекції, системний червоний вовчак, імуносупресія або імунодефіцит різної етіології та інші хронічні вірусні захворювання.

Період вагітності або годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

Заходи безпеки при застосуванні.

Тривалість курсу лікування настойкою ехінацеї не повинна перевищувати 8 тижнів. При зберіганні настойки можливе її помутніння та випадання осаду, який складається з активних полісахаридів, тому перед прийомом препарату флакон необхідно збовтувати.

Побливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітним та жінкам, які годують груддю, не слід застосовувати настойку, оскільки препарат містить спирт.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат містить спирт, тому слід утриматися від керування автотранспортом та роботи зі складними механізмами.

Інші застереження. Препарат не застосовувати дітям віком до 12 років через вміст етанолу.

Спосіб застосування та дози.

Для досягнення швидкого ефекту з початку лікування дорослим приймати по 40 крапель настойки, а потім протягом 2 годин ще 20 крапель. Далі препарат приймати по 20 крапель тричі на добу. Курс лікування – не більше 8 тижнів. Дітям від 12 років настойку призначати у розведенні 1:2 або 1:3 по 5-10 крапель 2-3 рази на добу за 30 хвилин до їди. При лікуванні ран настойку застосовувати місцево на уражені ділянки. Зовнішньо застосовувати у вигляді компресів, тампонів. 20-60 крапель настойки розводити у 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, змочувати цим розчином марлю, накладати на рану і накривати компресним папером. Пов'язку змінювати двічі на добу. Рекомендована тривалість лікування препаратом – від 1 до 8 тижнів.

Противпоказання.

Нудота, блювання, порушення з боку шлунково-кишкового тракту, порушення сну, підвищене збудження нервової системи, розлади сну. Терапія симптоматична.

Побливі ефекти.

Побливі реакції: почервоніння шкіри, свербіж, висипання, кропив'янка, синдром Стівенса-Джонсона, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.

Побливі реакції органів дихання: утруднення дихання, бронхоспазм з обструкцією, астма.

Побливі реакції центральної нервової системи: запаморочення.

Побливі реакції серцево-судинної системи: артеріальна гіпотензія.

Побливі реакції травного тракту: нудота, блювання, діарея.

Також окремі повідомлення про зв'язок з аутоімунними захворюваннями (дисемінований енцефаломієліт, вузликова еритема, імунотромбоцитопенія, синдром Еванса, синдром Шегрена-Ларссена з порушенням тубулярної функції нирок).

При тривалому застосуванні (понад 8 тижнів) може виникнути лейкопенія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Через дію імуностимулюючої дії ехінацеї препарат може зменшувати ефективність препаратів, які чинять імунодепресивну дію.

Препарат не рекомендується застосовувати одночасно з препаратами з гепатотоксичною дією, такими як аміодарон, метотрексат, кетоконазол, стероїдні препарати.

Препарат містить етанол, який може підвищувати абсорбцію і фармакологічну дію деяких седативних препаратів та опосередковано, змінюючи активність системи цитохрому Р450, впливати на елімінацію лікарських засобів, які метаболізують з участю ферментів цієї системи. Етанол може спричинити дисульфірамоподібну реакцію при одночасному застосуванні, наприклад, з деякими антибактеріальними засобами.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 мл у флаконах у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.