

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

### ДЕНТА КРАПЛІ

#### Склад лікарського засобу:

*діючі речовини* : 1 мл препарату містить хлоралгідрату 333 мг, камфори рацемічної 333 мг;

*допоміжна речовина*: етанол 96 %.

**Лікарська форма.** Розчин зубний .

Безбарвна прозора рідина з запахом камфори.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м . Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

#### Фармакотерапевтична група.

Засоби для місцевого застосування у стоматології.

Код АТС А01А D11.

Препарат чинить помірну знеболювальну та антисептичну дію, зумовлену фармакологічними властивостями речовин, що входять до його складу.

#### Показання для застосування.

Зубний біль при карієсі, в тому числі ускладненому пульпітом.

#### Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до речовин, які входять до складу препарату, схильність до судомних нападів, бронхіальна астма. Уникати контакту з ушкодженою слизовою оболонкою.

#### Належні заходи безпеки при застосуванні.

При появі будь-якої небажаної реакції слід припинити застосування препарату і змити його залишки з місць застосування.

#### Особливі застереження.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Оскільки препарат містить етанол, його не можна призначати вагітним та жінкам, які годують груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Препарат впливає на швидкість психомоторних реакцій, тому на період лікування слід уникати керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

#### *Діти.*

Препарат не застосовувати для лікування дітей.

#### Спосіб застосування та дози.

Застосовувати дорослим. Для усунення зубного болю ватний тампон, змочений 2-3 краплями препарату, закладати у каріозну порожнину зуба на 5-10 хв.

#### Передозування.

При випадковому потрапленні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання. Лікування симптоматичне.

#### Побічні ефекти.

*З боку нервової системи:* запаморочення, сонливість, головний біль, збудження, судоми.

*З боку дихальної системи, органів грудної клітки:* бронхоспазм.

*Алергічні реакції,* включаючи шкірні висипання, кропив'янку, свербіж, еритему.

#### Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що не відома.

**Термін придатності.** 4 роки.

#### Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

#### Упаковка.

По 10 мл у флаконах в пачці або без пачки, або по 20 мл у флаконах-крапельницях в пачці або без пачки.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.