

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 3 %

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: кислота борна;
100 мл розчину містять кислоти борної 3 г;
допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування

Прозора, безбарвна рідина із запахом спирту.

Назва і місце знаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Антисептична дезінфекційні засоби. Код АТС D08A D.

Препарат чинить антисептичну дію. Коагулює білки (у тому числі ферменти) мікробної клітини, порушує проникність клітинної оболонки, завдяки чому затримується ріст і розвиток бактерій. При зовнішньому застосуванні препарат абсорбується через ушкоджену шкіру, ранову поверхню; при випадковому прийомі внутрішньо – через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Кислота борна може накопичуватися в тканинах організму. Виводиться з організму повільно.

Показання для застосування.

Піодермія, мокнуча екзема, попрілість, гострий та хронічний середній отит.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до кислоти борної, порушення функції нирок, хронічний мезотимпаніт нормальною або мало зміненою слизовою оболонкою, травматичні перфорації барабанної перетинки період вагітності або годування груддю, у тому числі для обробки молочних залоз, дітям (у тому числі новонародженим).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не застосовувати препарат на великі ділянки шкіри, не застосовувати для промивання порожнин. Не допускати потрапляння препарату в очі.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Дітям препарат не застосовують

Спосіб застосування та дози.

Застосовують зовнішньо. При піодермії, попрілостях, екземі уражені ділянки шкіри обробляють за допомогою серветки, попередньо змоченої препаратом, 2-3 рази на добу.

При отиті у зовнішній слуховий прохід вводять змочені розчином турунди або закапують по 3-5 крапель 2-3 рази на добу.

Передозування.

У разі випадкового прийому препарату внутрішньо провести зондове промивання шлунка, призначити внутрішньо сольові проносні засоби, ентеросорбенти (активоване вугілля), симптоматичну терапію.
Симптоми гострого отруєння: нудота, блювання, діарея, порушення кровообігу та пригнічення центральної нервової системи, зниження температури тіла, шок, кома, еритематозні висипання. У разі тяжкого отруєння вживають заходів щодо підтримання життєво важливих функцій організму, проводять гемодіаліз або перитонеальний діаліз, заміне переливання крові. При тривалому застосуванні препарату на великих заплещо ділянках шкіри можуть виникати симптоми хронічної інтоксикації: набряк тканин, виснаження, стоматит, екзема, порушення менструального циклу у жінок, анемія, судоми, алопеція. У цих випадках препарат відміняють, проводять симптоматичне лікування.

Побічні ефекти.

Застосування препарату може спричинити алергічні реакції (почервоніння шкіри, свербіж, кропив'янка, висипання, набряк). У поодиноких випадках – розвиток анафілактичної реакції, включаючи шок; десквамація епітелію.
При тривалому застосуванні та у пацієнтів з порушенням функції нирок можуть виникати нудота, блювання, діарея, головний біль, сплутаність свідомості, олігурія, судоми.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 мл або по 25 мл у флаконах у пацці або без пацки.

Категорія відпуску. Без рецепта.