

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**КАНЕФРОН® Н (CANEPHRON® N)**

**Склад лікарського засобу :**

*діючі речовини:* 100 г крапель містять 29 г водно-спиртового екстракту (1:16) з лікарських рослин:  
трави золототисячника (*Herba Centaurii*) 0,6 г  
кореня любистка (*Radix Levistici*) 0,6 г  
листя розмарина (*Folia Rosmarini*) 0,6 г  
*допоміжна речовина:* вода очищена, етанол 19 % (об/об);

**Лікарська форма .** Краплі оральні.

Прозора або злегка мутна рідина жовто-коричневого кольору, із запахом любистку та ароматним, трохи гіркуватим смаком.

**Назва і місцезнаходження виробника.** Біонорика СЕ, Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт, Німеччина.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04В Х.

Компоненти, що входять до складу рослинного лікарського засобу, виявляють комплексну активність, що проявляється у протизапальній дії та усуненні спазму сечовивідних шляхів, сечогінному, вазодилатативному ефектах.

Усі рослинні компоненти, що входять до складу Канефрону® Н, містять речовини (фенолкарбонові кислоти, ефірні олії тощо), що зумовлюють ефективність антимікробної дії препарату. Дія препарату на каналцеву і клубочкову систему нирок призводить до зниження виділення білка при протеїнурії.

**Показання для застосування.**

Основна (базисна) терапія, а також як компонент комплексної терапії при гострих та хронічних інфекціях сечового міхура (цистит) і нирок (пієлонефрит).

Хронічні неінфекційні захворювання нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит).

Профілактика утворення сечових каменів, у тому числі й після їх видалення.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Пептична виразка у стадії загострення.

Краплі не слід застосовувати як монотерапію у випадках порушень функції нирок.

Не слід застосовувати Канефрон® Н для діуретичної терапії набряків, спричинених серцевою або нирковою недостатністю.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Під час зберігання препарату можливе помутніння або випадання осаду, проте це не впливає на дію препарату. При застосуванні крапель Канефрон® Н необхідно вживати достатню кількість рідини.

При запальних захворюваннях нирок слід обов'язково проконсультуватися з лікарем.

При появі крові у сечі, розладів сечовипускання та гострої затримки сечі необхідно негайно звернутися до лікаря.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю при дотриманні рекомендацій щодо застосування після оцінки лікарем співвідношення користь для матері /ризик для плода (дитини).

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Препарат у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортом і працювати з іншими механізмами.

**Діти.**

Препарат не рекомендується застосовувати дітям віком до 1 року. Дітям краплі слід застосовувати у розведеному вигляді.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат приймають у таких дозах:

- дорослі – по 50 крапель 3 рази на добу;
- діти віком 1-5 років – по 15 крапель 3 рази на добу;
- діти віком старше 6 років – по 25 крапель 3 рази на добу.

Дорослі краплі приймають, як правило, у нерозведеному вигляді. Дітям краплі слід додавати у сік або чай. Перед вживанням збовтати. Флакон слід тримати вертикально.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.**

Випадки отруєння препаратом внаслідок його передозування невідомі.

Терапія: симптоматична.

**Побічні ефекти.**

Дуже рідко у разі підвищеної чутливості до складових компонентів препарату можуть виникати алергічні реакції, такі як висипання, кропив'янка, свербіж, гіперемія шкіри, а також порушення з боку травного тракту (нудота, блювання, пронос).

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності .** 2 роки.

Відкритий флакон можна використовувати протягом 6 місяців.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 100 мл у флаконі у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.